



藥物常識



之 藥物過敏 知多少



香港浸信會醫院
九龍窩打老道 222 號

www.hkbh.org.hk

藥物過敏 Q & A

-藥物過敏常見問題解答-

什麼是藥物過敏？




人體的免疫系統是身體的防衛網，若是遇到外來而又不同於自身的物質，爲了保護身體，免疫系統會有一連串的反应，目的是要排除這外來的物質對身體的危害。藥物過敏是指因人接觸到某些藥物過敏原 (Allergen) 而引起身體免疫系統產生一連串過度的反應。過大的反應可能令患者帶來傷害。

過敏反應通常不會在第一次服用藥物時發生，當身體第一次接觸到藥物時，身體便會產生免疫球蛋白 (IgE)，並與細胞上的受體結合。當身體再次接觸到此藥物時，藥物便與免疫球蛋白 (IgE) 結合，引致細胞爆裂，釋出化學物質，引致過敏反應。

藥物過敏反應有什麼徵狀？

輕度反應：局部性的徵狀如蕁麻疹(風疹 urticaria)、痕癢或浮腫(如：嘴唇、眼瞼)、



打噴嚏等。

中度反應：蔓延至全身的反应、全身出疹或痕癢、呼吸急促等。



嚴重反應 (Anaphylaxis)：

較爲罕見，但會致命。病人通常會突然出現上述一般的過敏反應，但情況會在數分鐘內惡化至較嚴重的徵狀，包括頭痛、噁心、嘔吐、喉嚨腫脹引致氣喘及呼吸困難、痙攣、心律不整、血壓下降，休克昏迷，甚至死亡。



藥物過敏反應的徵狀可在服藥後數分鐘或數天產生，其影響可維持數分鐘至數小時不等，視乎服食藥物的份量和敏感的嚴重性。由於遺傳、性別、年齡、藥史、病歷的不同，一般人服後發生過敏的機會或嚴重程度也有不同，但目前並未發現決定藥物過敏的基因。



什麼藥物會引起過敏反應？

理論上，任何藥物都有引起過敏的可能性，但以下幾類藥物會較常引起過敏反應：



- 止痛藥，例如：阿斯匹靈、非類固醇消炎藥、嗎啡、可待因
- 抗生素，例如：盤尼西林、頭孢子素、磺胺劑、四環素

什麼人會較容易有藥物過敏？

- 長期或多次服用藥物
- 大劑量服用藥物
- 注射比口服藥物較容易引致過敏
- 有過敏或哮喘的家族史
- 由於某些藥物是從食物提煉出來的，例如雞蛋、黃豆、貝類海產，因此，對這些食物敏感的人要格外小心。



藥物過敏反應是副作用嗎？

藥物過敏反應與藥物副作用是不同的，前者是一種身體的免疫反應，是不能預知的。而後者是由於藥物本身的藥理作用，對

身體不同器官和系統造成可預知的影響。例如服用盤尼西林會引致腸胃不適、服用非類固醇類消炎藥後出現胃痛、某些降血壓藥會引起咳嗽或昏厥等，這些都是藥物副作用而不是過敏反應。若有疑問，可詢問您的醫生或藥劑師。

怎樣處理和預防藥物過敏？

對於不同的藥物過敏，有不同的預防和處理的方法，例如，透過皮膚測試 (Skin test) 及血液檢查作藥物過敏診斷、使用替代藥物、或對不能替代的藥物採用脫敏治療 (Desensitisation)，醫生亦會針對不同的過敏症狀，同時處方類固醇或抗組織胺類的藥物。萬一您曾有對藥物過敏或不適的情形，別忘了每次看病時，主動提醒您的醫生或藥劑師，並建議您將可能引起過敏的藥物名稱寫下來隨身攜帶在身上，以供醫護人員作參考，確保個人用藥的安全。



香港浸信會醫院藥物敏感記錄咭：

 香港浸信會醫院 HONG KONG BAPTIST HOSPITAL 藥物敏感記錄 Drug Allergy Record	
姓名 Name: _____	
醫院編號 Hosp. No.: _____	
此處填上您掛 號咭的姓名。	此處填上您掛 號咭的號碼。
每次就診時，請出示此咭給你的醫生。 Please present this card to your doctor in every consultation.	
敏感藥物名稱 Name of Allergy Drug(s): 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	
填上令您過敏的藥物 名稱	

藥物敏感記錄咭可在藥房索取。

此藥物指引只供參考之用。

用藥應照醫生指示。

如有疑問請向主診醫生或藥房職員查詢。

藥物查詢熱線：☎ 2339-8964

香港浸信會醫院網址：www.hkbh.org.hk

香港浸信會醫院藥房編制 09/2010